

A tojó már a téli szálláshelyén elkezdte a fűfélékből boltíves fészket elkészíteni, ahol pár napon belül megjelentek a tojások is. A tojások alapszíne fehér, hosszúkás. A tojó 4-6 tojást rak egyszerre. A tojásokat keltetőgépbe helyeztem, 65%-os páratartalmat beállítva, 37,8 fokos hőmérsékleten. A tojások kelési ideje 21 nap. A tojások forgatását a 19-ik napom befejeztem, ugyanis a csibe ilyenkor már mozgásnak indul a tojáson belül.



A csibe a tojást feltörését számított 24-36 órán belül kibújik a tojásból. Miután felszárad infralámpa alá helyeztem, ahol a padozatra világos színű pokróc volt terítve. Már egy napos korukban a pulykaindító táp mellé UniPatte-t és lisztukacot kaptak. A kicsiket 5,5-ös gyűrűvel láttam el. 4 hetes koruk körül megindult a kiszoktatás, amihez gyorsan alkalmazkodtak is. A növénydékek 2 hónapos koruk körül elkezdnek színesedni, bár ilyenkor még a kakasok is zöldes tollazatot kezdenek növesztetni. Később vedlenek át. Hamar megkülönböztethető lesz a két nem, ugyanis a kakasok sűrű vörös bőbitája már ebben a korban növesznek indul.

A növénydek madarak már 1 hónapos koruk körül felülnek éjszakára az ágakra, így biztosítunk nekik mindenképp éjszakai ülőalkalmatosságot.

A roul-roul tenyésztését nem ajánlom kezdő madártartóknak, mert sajnos sok kudarc érheti őket. Tapasztaltabb madarászoknak viszont csak ajánlani tudom ennek a gyönyörű madárnak a tartását.

Bencsik Dominik Bence

SIROKI ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY

IDŐSZAKI KIADVÁNYA

46. SZÁM

2023 ÁPRILIS-JÚNIUS

IMPRESSZUM

SIROKI ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY IDŐSZAKI KIADVÁNYA

MEGJELENIK: negyedévente

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: az alapítvány elnöke és kuratóriumi tagjai

A kuratórium elnöke: Varga Sándor
A kuratórium tagjai: Küzmös Csaba
Lakó Antal
Vajó Sándor
Virágh Dezső

LEVELEZÉSI CÍM: Varga Sándor Nyírtura, Rózsa u. 10. 4532

EMAIL CÍM: vargasa@freemail.hu

HONLAP: www.sirokialapitvany.hu

ADÓSZÁMUNK: 18044861-1-15

TENYÉSZTŐI BESZÁMOLÓK A HAZÁNKBAN TENYÉSZTETT RITKA MADÁRFAJOK TENYÉSZEREDMÉNYEIRŐL 65. RÉSZ

A roul-roul vagy csokros fűrj (*Rollulus rouloul*) tartása és tenyésztése

A roul-roul a madarak osztályának fácánfélék családjába tartozó főleg talajon élő madárféle. Természetes élőhelye az Indonéz szigetcsoporthoz (Dél-Burma, Dél-Thaiföld, Malajzia, Szumátra és Borneó). A roul-roul napközben a talajszinten az alsó növényzetben keresi táplálékát, éjszakára felhúzódik a lombkorona szintbe, és az ágak között éjszakázik.

Az ivari dimorfizmus jól látható a két nem között. A tojó feje szürkés, fejtetőn 2-3 szál vékony szőrszerű toll található. A szem körül vöröses szemgyűrű található. Teste zöldes alapszínezetű, szárnytollai világos barna, csőre fekete. A kakas fején vörös színezetű sűrű bóbíta található, homlok részén fehér csík húzódik. A szeme körül vörös szemgyűrű található, viszont a fej és a testszín is fémes kék színezetű. A kakasok testszíne egységesen kékkes hatású, csőrük piros és fekete színezetű. Mindkét nemnek a lába piros, viszont a hátsó lábujjukon nem található köröm, csak az első három lábujjon. A hazai klímához jól alkalmazkodtak, bár télen minimális fűtést igényelt (minimum 5 C°).

Táplálkozását tekintve mindenevőnek tekinthetőek. A természetben elfogyasztanak gyümölcsöket, növényi hajtásokat, rovarokat és magokat. A hozzám érkező pár helyét úgy alakítottam ki, hogy legyen megfelelő mennyiségű búvóhely és ülőrud legyen számukra.

Mivel ezek a madarak nem kedvelik a gyakori zargatást, így minden etető és itatóédényt az ajtó közelében helyeztem el, a padozatra pedig apróra vágott fűvet és faforgácsot szórtam. A roul-roul párvalasztó madár, de ennek ellenére jól tartható csoportban is.

Mesterséges tartás során, figyelembe véve a természetes élőhelyüket, alaptakarmányként kölest, napraforgót, négermagot, roppantott búzát adtam, UniPatee lágyevőknek részére készített eleségével kevertem. Hetente 3-4 alkalommal a röpdé alsó részére lisztukacot, gyászbogár-lárvát és barna tücsköt szórtam, ami kimondott nagy kedvencük volt.



Vizüket almaecettel savanyítom, gyógyszereket nem itatok velük. Ellenálló, szívós madarak, a hideget élőhelyükből adódóan jól tűrik, a nyári nagy meleget azonban nem igazán szeretik.



Gulyás István

Tisztelt Madárbarát

A májusi hónap a civil szervezetek életében a bevallások, jelentések, igazolások elkészítésének és beadásának hónapja. Nincs ez másképp Alapítványunk esetében sem. Megtörtént az adóbevallás, az adó 1 %-ának fogadásáról történő bevallás, a pénzügyi mérleg és a statisztikai jelentés elkészítése, és a hivatalos szervek felé történő lejelentés.

2022-ben 24437 Ft támogatás érkezett a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából, bízunk benne, az idei évben ezt az összeget jócskán túlléphetjük. Köszönjük mindenkinek, aki Alapítványunk felé tette meg ezt a felajánlást.

A nyári hónapok végével ismét esedékessé válik, a Siroki-díj ez évi átadása egy kiváló hazai tenyésztőnek. Az Alapítvány kuratóriuma összegyűjti az ajánlásokat, és kiválasztja a kedvezményezettet. Kérjük, juttassák el hozzánk Önök is annak a személynek a nevét, aki megítélésük szerint méltó e kitüntetésre!

Az ez évi díjátadó helyszínét és időpontját következő számunkban igyekszünk közreadni.

E kiadványunkban ismét remek tenyészleírásokat olvashatnak ritka díszmadárfajok hazai tenyésztéséről. Három nagyszerű tenyésztő osztja meg nagyszerű eredményeit velünk, amiért nem lehetünk elég hálásak nekik!

Várjuk a hasonló írásokat kiadványunk következő számaiba.

VÁLOGATÁS SIROKI ZOLTÁN ISMERETTERJESZTŐ ÍRÁSAIBÓL 46. RÉSZ

Hibridizációs eredmények 1972. évben

A madártenyésztés során nem egyszer érik az embert meglepetések, nem várt tenyésztési eredmények, melyek lehetnek kellemesek, de kellemetlenek is. Én is így jártam az elmúlt esztendőben.

Kis szarkapinty párom első költése nem volt valami termékeny, csupán két fióka repült ki. A második költés hét tojásából azonban nagy örömömre, kikelt hat fióka, és fel is nevelődött valamennyi. Eddig rendben is volna a dolog, de még csupaszok voltak a kicsinyek, és máris feltűnt, hogy az egyik nagyon kicsi, öt testvére jóval fejlettebb volt. El voltam készülve, hogy a többi elnyomja, és el fog pusztulni, de nem így történt.

Szépen felnőtt mind a hat, de már a kirepüléskor feltűnt, hogy a nagyságkülönbség megmaradt, sőt fokozódott. Nyilvánvalóvá vált, hogy a kistermetű fióka valódi szarkapinty, a többi ellenben egy más fajhoz tartozó, nagyobb természetű apának köszönheti létét.

A színeződés megindulásakor kisült a huncutság. Az öt nagytermetű fióka gyorsan színeződni kezdett, a kicsi ellenben igen lassan. A lassú, hónapokig húzódó színeződés a szarkapintyre jellemző, a gyors ellenben a sirálykára. Nyilvánvalóvá vált, hogy a szarkapinty mama, egy, a volierben szabadon költő him sirálykával lépett félre. A kiszínezetlen fiókák valamennyien egyforma színűek voltak. Felül sötétebb, alul világosabb barnák.

A kiszíneződött hibridek színe a következő: feje, torka és begye fekete, a fej hátsó része és a hát szürkésbarna. A deréktáj és a felső farkfedők fehér színűek, fekete keresztcsikkokkal. A toll alsó része fehér, több-kevesebb, főleg a testoldalakon sűrűsödő fekete keresztcsikkokkal. A csőr felső kávája sötétebb, alsó kávája világosabb szaruszínű. A hibridek nagysága a két szülő között áll. Csinos, eleven madarak, nem veszekednek, csak az a kár, hogy mindkét nem meddő. Tehát továbbbszaporításra nem alkalmasak. Nem lehetetlen azonban, hogy dajkaszolgálatra felhasználhatók.

FOLYTATJUK

Díszmadártenyésztés 1973. 1.-2. szám

TENYÉSZTŐI BESZÁMOLÓK A HAZÁNKBAN TENYÉSZTETT RITKA MADÁRFAJOK TENYÉSZEREDMÉNYEIRŐL 64. RÉSZ

A himáljai galamb (*Columba pulchricollis*) tartása és tenyésztése

A himáljai galamb Kína, India, Laosz, Nepál és Thaiföld mérsékelt övi, 1300 és 3000 méter magasságban elterülő erdőinek lakója.

A hím és a tojó nagyon hasonló, rendszerint a nemek elkülönítése DNS vizsgálatok alapján lehetséges. Természetes élőhelyén gyommagvakkal, gabona magvakkal, bogoykkal táplálkozik főként. Habár óriási elterjedési területtel bír, állománya folyamatosan csökken.

Első madaraim 2016 letelején érkeztek Németországból. Egy párat vásároltam, a madarakat egy belső, 1,5 x 1,5 x 1,5 méteres kisrópdében helyeztem el télire. A helyiségben 5-10 C° uralkodott. A pár tavasszal, március végén egy nagyobb, külső rópdébe került, melynek mérete 1,3 x 2 x 2,6 méter volt. A rópdé sóderral felszórta, erdei fenyő ágakkal dekorált volt.

Igazán szelíd, nem agresszív faj, más galambokkal (pl. Barlet, zöldszármű, tamburin galamb) együtt tartható nagyobb helyen költési szezonban is. A rópdé, a talajon való mozgása, a hímek udvarlása az örvös galambhoz nagyon hasonló.

2 fészekdobozt helyeztem el benne, lucernaszenával béleltem ki őket, amiből a talajra is szórtam. Ebből a szétszórta szénából hordott még a hím a fészekbe valamennyit. A tojó lerakta egyetlen tojását, melyen hozzátévelegesen 20 napig kotlott. A pár a fióka 3 hetes kora körül újra letojta, és habár kotlottak is a tojások – a hím nappal, a tojó éjjel inkább – nem kelt ki fióka belőle.

Ez a pár azóta is ezzel a rendszerességgel rakja le tojását, és minden esetben sikertelen lesz a költés, olyan hamar követi a második fészekalj az első. Más himáljai galambpárjaim nem tojnak le ilyen hamar az első költés után.

A második sikertelen költést abban az évben még két sikeres követte, júliusban és szeptemberben.

Takarmányozásuk kukoricával, kendermaggal, cirokkal, szeklicével, vörös és fehér kölesel történik. Gyümölcsöt nem esznek, a lisztkeletet sem szeretik igazán. Nutribird T16 pellettel egészítem ki takarmányukat.

Ennél a fajnál érdekességként megfigyelhető, hogy éjszakára a szülők visszahívják a fiókákat a fészekbe. Azért is meglepő jelenség ez náluk, ugyanis a kifejlett madarakat sokszor látom nem az ülőrúdon aludni, hanem lent a kalitka vagy röpde alján.

Nagyon különleges és előkelő megjelenésű madarak, gondos odafigyeléssel sok örömet és vidámságot szereznek minden tenyésztőnek és madártartónak egyaránt.



Varga Zoltán

TENYÉSZTŐI BESZÁMOLÓK A HAZÁNKBAN TENYÉSZTETT RITKA MADÁRFAJOK TENYÉSZEREDMÉNYEIRŐL 63. RÉSZ

A festett asztrild (*Emblema pictum*) tartása és tenyésztése

A festett asztrild rendszertanilag a madarak osztályának, a verébalakúak (*Passeriformes*) rendjébe, ezen belül a díszpintyfélék (*Estrildidae*) családjába tartozó *Emblema* nem egyetlen faja.

Ausztráliában honos, természetes élőhelyei szubtrópusi és trópusi száraz szavannák, bokrosok és gyepek, valamint vidéki kertek. Állandó, nem vonuló faj. Testhossza 11 centiméter. Magvakkal táplálkozik, de fogyaszt rovarokat is. 4-6 fehér tojást tojik, amelyekből 14 nap alatt kelnek ki a fiókák.



Az általános tudnivalók után saját tapasztalatimról szeretnék írni. Jelenleg 4 költőpárral dolgozom.

A festett asztrild egy olyan madár, ami minden szempárt magával ragad az elegáns megjelenésével, kedves, békés természetével. Megjegyzem, ez csakis költési időszakon kívül igaz.

Nálam a madarak április végétől egészen szeptember végéig pihenő időszakban vannak, ilyenkor a párokat külön tartom.

Tudom, sokan nem szeretik szétszedni a párokat, de mivel nem egy életen át tartó párválasztó madarokról beszélünk, így ez náluk nem jelent problémát.

200x150x60 cm-es röpdében helyezem el őket. A levélasztást követő néhány héten belül beindul a nagy vedlés, ilyenkor fajspecifikus száraz maggal etetem őket- amit a Heimtierfutter Blattner cégtől vásárolok - , illetve heti egyszer zöld eleséggel is megkínálom őket, ami lehet saláta, madársaláta, brokkoli, sárgarépa kombinációja.

Heti egyszer kapnak vízben oldott vitaminokat. Madaraimnál a Promotor43 vált be, kapnak még kalcium+ D3 vitamint is. Mindig előtűk van aprított szépia csont, madárhomok grittel, illetve hő kezelt tojásbéj.

Főleg a tojók esetében nagyon fontos a kalcium készletek, az üreges csontok feltöltése. Beltéri röpdém vannak, ezért speciális madár fénycsövekkel szereltem fel azokat, melyek nagymértékben segítik a madarak regenerálódását.

Tapasztalataim szerint a hímek és a tojók kicsit eltérően élik meg ezt az időszakot. Amíg a hímek elevenek, a tojók tényleg sokkal többet pihennek, fürdenek, napoznak, de a vedlés szinte egyszerre indul meg náluk.

Ezután következik a nyugalmi időszak. A madarak szépen növesztik új tollruhájukat, szemlátomást egyre energikusabbak lesznek, de még mindig a nyugalmi időszakhoz való etetés zajlik.

A hímek egyszerű éneke egész évben hallható, csak ebben az időszakban ritkábban. Ez nálam egészen szeptemberig tart, amikor a fitt madarakat párba rakom. Mindegyik pár egy 100x80x60 cm-es tenyészkalitkába kerül. Fészek-odút még nem kapnak, egyszerűen figyelem a párokat, mennyire harmonizálnak, elfogadják-e egymást, illetve a hím elkezdett-e udvarolni a tojónak? A hím a tojó mellé ugrik, kihúzza magát és hallható egyszerű énekével hívja fel magára a figyelmet, miközben a fejét ide-oda mozgatja. Ha tojó elfogadja az udvarlást, ő is kihúzza magát és a hímnel együtt mozgatja a fejét, majd előre dölve jelzi, hogy készen áll a párzásra.

Ilyenkor már szoktam magokat csíráztatni, gyári tojásos lágyeleséget és kis apró, fagyasztott rovar, zöld eleséget adni nekik. De mindezt mértékkel, túlzásba nem szabad vinni, nehogy a madarak túlpörögjenek. Ez tehát heti 2-3 alkalmat jelent, illetve 2 alkalommal vitaminos vizet kapnak. Kb. 2-3 hét múlva felakasztom a pintyes odút, ilyenkor a hím mindent felhasznál, amit talál, hogy teljesen beépítse az odút.

Ezért én az odú nyílását műnövény, levelek felragasztásával szűkítem, hogy ne tudja kiverni se a tojást, se az apró fiókát. Nem utolsó sorban ezzel növelem a biztonságérzetüket is.



A fészekrakás pár nap alatt be is fejeződik: kókuszrost, finom szárított fűszálak (pl. ami a Fressnapfban kapható), nyulaknak való széna... ezeket nagyon szeretik felhasználni a fészek építéséhez.

A párzás sűrűbbé válik, és nem sokára megjelennek az első fias tojások, ilyenkor elveszek minden kiegészítő takarmányt és csak száraz magot és vizet kapnak, hogy elkerüljem a hímek túlpörgését, ami azt jelenti, hogy folyamatosan rakja a fészket, a meglévő tojásokat kidobálja vagy egyszerűen rájuk hordja a fészekanyagot.

A tojók estében előfordul a tömeges tojásrakás. Ez esetekben a tojás legtöbbször nem szemes, hiszen a hím kizárólag a fészekrakással van elfoglalva, illetve a tojó nem kotlik el.

Egy jól összehozott pár szép eredménnyel költ egymás után, akár 3 költést is kaphatunk tőlük. Kelés előtt 1-2 nappal újra kapnak lágyeleséget, amit kiegészíték főtt tojássárgájával, vitaminnal, zöldelével és apró fagyasztott rovarral. Mindig annyit adok nekik, amit pár óra alatt elfogyasztanak.

A fiókák növekedésével mindig emelem az adagot. Nálam 22-25 naposan hagyják el a fészket, akkor már szépen kitollasodva repülnek első köreiket.